

Riesgos de los implantes mamarios

Los implantes de senos tienen muchos beneficios, pero también tienen riesgos. Este folleto explica algunos de los riesgos que puede tener con los implantes de senos.

Cambios en sensibilidad y entumecimiento

Quizá haya notado menos sensibilidad o entumecimiento en la piel de su pecho desde su mastectomía. La cirugía de implantes de senos puede causar más cambios en la sensibilidad. Estos cambios pueden ser temporales o permanentes.

Arrugas

Algunos pacientes ven que se arruga el implante debajo de la piel. A veces, puede sentir el borde del implante. Estos problemas son usualmente leves y no necesitan tratamiento. Raramente, las arrugas pueden causar problemas y requieran más cirugía.

Contractura capsular

La contractura capsular sucede cuando su cuerpo genera un exceso de tejido cicatricial, llamado cápsula, alrededor del implante. La cápsula puede cambiar de forma y causar dolor o hacer que el seno se vea diferente. La mayor parte del tiempo, la cápsula no provoca dolor ni problemas de salud. Si hay dolor o cambio de forma, una cirugía pueda ser necesaria.

Asimetría y Posición

Los senos reconstruidos usualmente se ubican arriba del pecho y no son tan suaves como los senos originales. Esperamos a que la mayoría de los implantes se acomoden hacia abajo en el pecho, a medida que los pacientes se recuperan de la cirugía. Un seno puede tener forma y tamaño diferente del otro.

Si la reconstrucción es solo de un lado, pregunte sobre las opciones en el otro seno para que tengan la misma simetría.

A pesar de que ambos senos nunca se verán exactamente iguales, nuestra meta es ayudarla a sentirse cómoda en cómo se vea en un sostén y en su ropa. Algunas veces, más cirugía pueda ayudarle con la posición, contorno o problemas de simetría.

Infección

Aunque tratamos de prevenir una infección durante y después de la cirugía, algunos pacientes tienen síntomas de infección. La infección puede requerir tratamiento médico, sacando el implante y demorando la cirugía o eligiendo otra opción de reconstrucción.

El implante cambia a lo largo del tiempo

Los implantes podrán durar varios años, pero no necesariamente son permanentes. Los implantes pueden romperse o tener fugas que pueden provocar dolor o cambios de forma. Deberá hacer citas de seguimiento anuales o contactarnos si tiene dudas, inquietudes o vea cambios en sus implantes. Si su implante se ha roto o tiene fugas, necesitaremos reemplazarlo por uno nuevo.

Futuro riesgo de cáncer

Linfoma Anaplásico de Células Grandes (ALCL, por su sigla en inglés) es un cáncer raro del sistema inmunológico. Los investigadores han descubierto que el ALCL usualmente se presenta en el tejido alrededor de algunos tipos de implantes. Lo llamamos ALCL Asociado al Implante de Senos o BIA-ALCL.

BIA-ALCL sucede con muchos tipos de implantes, pero es mucho más común con implantes texturizados. Hasta ahora, el Instituto del Cáncer Huntsman, sólo usa implantes lisos y expansores.

Protéjase a si misma

Los pacientes con implantes de senos deben visitar a su cirujano regularmente y buscar ayuda ante dolor, bultos, hinchazón o asimetría.

Debe hacerse un autoexamen de senos para chequear sus implantes de senos y preguntarle a su médico otras maneras de encontrar problemas en forma temprana.