

## Bloqueo del ganglio impar

### ¿Qué es un bloqueo del ganglio impar?

El ganglio impar es un grupo de nervios situados frente al coxis que conectan la región de la pelvis inferior, la ingle, y las zonas reproductivas y rectales. Un bloqueo del ganglio impar es una inyección que ayuda a aliviar o "bloquear" el dolor en estos órganos. La inyección tiene un medicamento que adormece los nervios que envían los mensajes de dolor.

### ¿Cómo se realiza?

- Antes de recibir el bloqueo, su médico le administrará un medicamento para ayudarle a relajarse.
- Permanecerá boca abajo sobre una mesa de rayos X. Su médico utilizará una pequeña aguja con medicamento para adormecer una zona en la parte inferior de su coxis.
- Al estar su piel adormecida, su médico utilizará los rayos X para guiar una aguja en la zona. La aguja ayudará a que el medicamento contra el dolor llegue a los nervios.
- Su médico inyectará un colorante a través de la aguja. Esto ayuda a asegurar que la medicina vaya al lugar correcto.
- A continuación, su médico le dará el medicamento para el dolor. El medicamento adormecerá los nervios y los dañará para que dejen de enviar los mensajes de dolor.
- Después de su cita, tendrá que esperar en el hospital durante un corto tiempo antes de irse a casa. Su médico vigilará por cualquier problema que pueda tener con el medicamento.

### ¿Qué sucede después del procedimiento?

Su pelvis inferior podría sentirse caliente o "diferente" después de su cita. Aunque se sienta mejor, no maneje ni esté muy activo por 24 horas. Tómese con calma. Coma normalmente y tome sus medicamentos habituales. Si todavía tiene algo de dolor, está bien que tome su medicamento normal contra el dolor.

### ¿Cuáles son los riesgos?

La probabilidad de que algo salga mal es muy baja. Pero es importante que conozca los posibles riesgos.

- Hematomas en el lugar donde recibió la inyección.
- Sangrado en el lugar donde recibió la inyección.
- Lesión en los nervios
- Reacción alérgica a la anestesia
- Infección
- Más dolor
- Inflamación

### ¿Durante cuánto tiempo ayudará a aliviar mi dolor?

La anestesia durará hasta unas horas después de su cita. El medicamento en el bloqueo puede durar de varias semanas hasta 6 meses. Si no ayuda a aliviar su dolor, por favor háganoslo saber.

## Apoyo y Supervivencia de Oncología

Línea de Programación de la Clínica: 801-213-4266 • Línea de enfermería: 801-585-0157