

Su médico hizo una biopsia con aguja para obtener una muestra de células de la glándula prostática. Un patólogo utilizará un microscopio para examinar la muestra para detectar cáncer.

Esta hoja informativa habla sobre algunas cosas que a menudo suceden después de una biopsia con aguja. También le informa acerca de los problemas a los que debe estar atento mientras está sanando.

Los resultados deberían estar listos dentro de la semana posterior a su biopsia. Si no recibe sus resultados en una semana, llame a nuestra línea de enfermería: 801-587-4379.

Instrucciones para el cuidado domiciliario

Tómese con calma el día de su biopsia. Puede comenzar su actividad normal al día siguiente.

Si su antibiótico es ciprofloxacina o levofloxacina, necesitará descanso adicional. Evite los ejercicios que requieran mucho esfuerzo mientras esté tomando este medicamento y durante las 48 horas posteriores a su eliminación.

Aunque no es común, estos medicamentos pueden tener efectos secundarios que involucran a sus articulaciones y tendones. Llame a la línea de enfermería de inmediato si ocurre alguna de las siguientes cosas:

- Dolor o hinchazón de los tendones, especialmente cerca de su tobillo o su hombro
- Sonidos o chasquidos en un área del tendón
- Moretones en un área del tendón
- Debilidad o incapacidad para usar una articulación o extremidad

Puede que le den una receta de antibióticos para prevenir infecciones. Es importante que tome las pastillas según las indicaciones hasta que se acaben.

Es importante que beba suficiente agua. Esto ayuda a prevenir problemas con la orina. También ayuda a expulsar la sangre de la vejiga. Si su orina es de color rojo o rosado, asegúrese de beber mucha agua hasta que el color sea normal.

Para el dolor, tome acetaminofén (paracetamol) extra fuerte, como Tylenol, hasta que todo el sangrado se haya detenido. Después de eso, puede tomar ibuprofeno, como Advil. Puede obtenerlos en cualquier farmacia sin receta.

Sangrado después de la biopsia de próstata con aguja

Muchos pacientes presentan algún sangrado después de la biopsia de próstata con aguja, incluidos los siguientes:

- **Sangre en la orina.** Por lo general, esto cesa en unos pocos días, pero puede durar hasta 2 semanas.
- **Pequeña cantidad de sangrado con las deposiciones.** Esto generalmente se detiene en unos pocos días. Puede durar hasta 2 semanas.
- **Sangre en el semen.** Un color marrón ligero pálido o con sangre es normal. Esto generalmente se detiene en unos 10 a 14 días. Puede durar de 2 a 3 meses.

Es normal que ocurra este tipo de sangrado.

Algunos medicamentos que toma pueden hacer que sangre más:

- Aspirina diaria
- Medicamentos para adelgazar la sangre como ibuprofeno o warfarina

Si tiene un trastorno de la coagulación de la sangre, es posible que tenga un sangrado más grave. Su médico puede darle instrucciones especiales.

Cuándo llamar a la línea de enfermería

Si alguno de estos problemas ocurre, llame de inmediato:

- Sangrado que dura más que el tiempo mencionado anteriormente
- Sangrado que empeora
- Sangrado del recto que ocurre:
 - luego de las 24 horas posteriores a la biopsia y
 - cuando no hace deposiciones
- Signos de infección
 - Fiebre mayor a 100.3°F
 - Síntomas similares a la gripe
 - Escalofríos
- Dolor al orinar
- Dificultad para orinar

De lunes a viernes, de 8 a. m. a 4:30 p. m.

Línea de enfermería: 801-587-4379

De lunes a viernes, de 5 p. m. a 8 a. m., fines de semana y feriados

University of Utah Hospital 801-581-2121

Pregunte por el urólogo.