


## Instrucciones después de la cistoscopia o de la retirada del stent

Se ha sometido a un procedimiento llamado cistoscopia. Esta hoja informativa explica cómo cuidarse después.

El médico utiliza un tubo con una lente en el extremo para buscar problemas en el interior de la uretra y la vejiga. La uretra es el conducto que transporta la orina fuera del cuerpo.

Algunos pacientes pueden tener un tubo llamado stent que se colocó antes. El stent le ayudó a orinar. En estos pacientes, el médico utilizó la cistoscopia para extraer el stent.



*El sistema urinario en el cuerpo humano*

### Posibles efectos secundarios

Estas cosas pueden ocurrir después de este procedimiento:

- Sensación de ardor al orinar. Coloque un paño tibio y húmedo sobre la zona después de orinar. Esto puede ocurrir durante 1 o 2 días después del procedimiento.
- Orinar más seguido. Esto suele durar 1 o 2 días después del procedimiento.
- Pequeña cantidad de sangre en la orina. Su orina puede tener un ligero color rojo durante unos días después del procedimiento.

No se preocupe si le ocurren estas cosas. Si tiene mucha hemorragia o dolor, o si dura más que los tiempos indicados, llame a su equipo de atención.

Es posible que su médico le haya tomado una muestra de orina para realizar un análisis en busca de células cancerosas. Los resultados suelen tardar unos 7 días. Si han pasado 7 días y no tiene los resultados, llame al 801-587-4379.

### Cuándo Llamar

Si tiene cualquiera de estos problemas, llame inmediatamente a la línea de enfermería:

- Dificultad para orinar
- Sangre roja brillante en la orina
- Dolor al orinar
- Fiebre de 100,4°F (38°C) o superior
- Escalofríos
- Fuerte dolor en el abdomen
- Náuseas

Póngase en contacto con su equipo de atención al cáncer a través de MyChart o llame al

\_\_\_\_\_.

En caso de emergencia, llame al 911 o acuda al servicio de urgencias más cercano.