

A veces, sus evacuaciones intestinales llamadas heces, pueden ser duras. Podrían no ocurrir tan a menudo como siempre. A esto se le llama estreñimiento.

Hable con su médico acerca de cualquier cambio en sus evacuaciones intestinales. Pueden ser señales importantes acerca de su salud en general.

Los medicamentos contra el dolor pueden ocasionar estreñimiento. Si está tomando medicamentos contra el dolor, consulte con su médico si debe tomar algún medicamento para ablandar sus heces.

No necesita una receta para obtener un ablandador de heces que funcione bien. Muchos médicos recomiendan el docusato de sodio.

Senna-S es una marca de docusato de sodio. Hay muchas otras marcas. Puede conseguirlos en cualquier farmacia.

Tomar Senna-S le ayudará a tener por lo menos una evacuación intestinal cada dos días.

¿Cómo Tomar Senna-S?

- Tome Senna-S por vía oral con un vaso lleno de agua. Tome una pastilla en la mañana y otra en la noche. Puede tomar Senna-S con o sin alimentos.
- Si no ha tenido una evacuación intestinal 3 días después de haber empezado a tomar Senna-S, llame a su médico.

Efectos Secundarios

Senna-S puede causar estos problemas:

- Retortijones y molestias en su abdomen
- Evacuaciones intestinales acuosas, llamadas diarrea.

Normalmente, los retortijones y la diarrea desaparecen por sí mismos en un corto tiempo. Llame a su médico si no mejora dentro de 24 horas.

Consejos Importantes Al Usar Senna-S

- Necesita beber 6-8 vasos llenos de agua diariamente mientras está tomando Senna-S.
- Deje de tomar Senna-S cuando deje de tomar medicamentos contra el dolor.
- Hable con su médico antes de cambiar la cantidad de Senna-S que toma o la frecuencia con que lo toma.