


Medicamento Pazopanib (Votrient®)

Pazopanib (el nombre genérico de Votrient) es un medicamento oral utilizado para el tratamiento del cancer.

Cómo tomar Este Medicamento

Tome cuatro cápsulas de pazopanib una vez al día sin alimentos. Cada cápsula es de 200 miligramos. La dosis completa será de 800 miligramos una vez al día, a la misma hora cada día.



Es muy importante que usted tome este medicamento con el estómago vacío y únicamente con agua.

No coma por lo menos 2 horas *antes* de tomar el medicamento y por lo menos 1 hora *después* de haberlo tomado.

EJEMPLOS

Si usted toma su dosis cada mañana:

Tome cuatro cápsulas a primera hora de la mañana al despertar, cuando su estómago está vacío. Espere una hora antes de tomar su desayuno o beber cualquier cosa que no sea agua.

Si usted toma su dosis cada noche:

Espere por lo menos dos horas después de cenar o de haber comido cualquier postre. Tome cuatro cápsulas con agua antes de irse a la cama, y no coma otra vez hasta el desayuno del día siguiente.

Advertencias Importantes

Algunos alimentos y otros medicamentos podrían interactuar con pazopanib o evitar que funcione. Estos incluyen antiácidos comunes y medicamentos que reducen el colesterol. Si otro médico le prescribe medicamentos por cualquier razón, asegúrese de informarle que usted está tomando pazopanib.

- No tome suplementos o té de San Juan.
- No coma ni beba toronjas o jugo de toronja.

- Consulte con su médico antes de tomar antiácidos o cualquier otro medicamento mientras toma pazopanib. Efectos secundarios comunes.

Estos son los efectos secundarios más comunes de pazopanib:

- Diarrea
- Alta presión arterial - Pida a su médico que revise su presión arterial con regularidad
- El color del pelo cambia - El pelo puede perder su color durante el tratamiento
- Disminución de los niveles de tiroides - Se vigilará con pruebas de sangre
- Náuseas
- Fatiga
- Mucositis - Esto puede incluir boca sensible, llagas en la boca o cambios en el sabor
- Síndrome de mano-pie - Esto incluye cambios en la piel, tales como enrojecimiento, ampollas, callos, grietas, descamación, dolor o sensibilidad en sus manos o pies

Cuándo Llamar a su Médico

Para su seguridad, por favor llame a nuestra oficina para asegurarse que está bien tomar cualquier otro medicamento mientras está tomando pazopanib. Esto incluye cualquier clase de antiácido.

Si usted tiene alguno de los efectos secundarios citados arriba, por favor llámenos. Podemos darle medicamentos para ayudarlo a controlar los efectos secundarios. Su médico también le preguntará acerca de los efectos secundarios durante cada visita.

Infórmenos si usted está programado para tener cualquier tipo de cirugía. Usted podría tener que dejar de tomar pazopanib durante un corto tiempo.

De lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

Llame al consultorio de su médico a este número:

Fuera del horario de oficina, fines de semana y días festivos, llame al

801-587-7000.

Pregunte por el oncólogo de turno.