

Instrucciones posteriores a la transfusión

Su transfusión de sangre debería ser una experiencia beneficiosa y usted debería sentirse mejor después de esta terapia.

Reacciones a la transfusión

Algunas personas pueden tener una reacción adversa a los productos sanguíneos que reciben.

Estas son algunas señales de una posible reacción a la transfusión:

- Fiebre superior a 100.4°F (38°C)
- Escalofríos
- Dificultad para respirar
- Náuseas o vómitos
- Rubor en la cara, urticaria, sarpullido o picor
- Debilidad o desvanecimiento
- Orina roja o marrón o menos orina de lo habitual
- Dolor o supuración donde estaba la vía intravenosa
- Dolor en el pecho o parte inferior de la espalda

Si ocurre alguno de estos problemas en un lapso de 48 horas de su transfusión, comuníquese con su equipo de atención del cáncer a través de MyChart o llame a

En caso de emergencia, llame al 911 o diríjase al departamento de emergencias más cercano.

Instrucciones a seguir en el hogar

Medicamentos _____

Actividad _____

Seguimiento _____

Instrucciones de _____ Fecha _____

Otras señales a las que debe prestar atención

Las enfermedades causadas por una transfusión son muy raras. Las señales pueden no aparecer durante varios meses. Llame a su médico si usted desarrolla alguna de estas señales:

- Fatiga
- Pérdida del apetito
- Orina oscura incluso cuando bebe abundante líquido
- Color amarillo en la piel o los ojos
- Náuseas o vómitos
- Diarrea que no mejora
- Dolor de barriga que no desaparece