

Aerosol nasal Stimate®

Sus médicos quieren que usted use el aerosol nasal Stimate®. Este medicamento es un tratamiento para la hemofilia leve y ciertos subtipos de la enfermedad de von Willebrand. Estos dos trastornos de la sangre pueden hacer que usted sangre durante períodos de tiempo prolongados incluso a partir de lesiones pequeñas. Stimate ayuda a detener el sangrado más rápido.

Antes de usar Stimate

Asegúrese de informar a sus médicos acerca de todas sus condiciones médicas, incluyendo cualquiera de las siguientes:

- Problemas del corazón, circulación sanguínea o presión arterial
- Sodio bajo en sangre (hiponatremia)
- Un historial de convulsiones
- Dificultad para respirar por su nariz
- Cirugía en su nariz, reciente o en el pasado
- Una afección que produce desequilibrios en los fluidos, tales como fibrosis quística, fallo del corazón o problemas renales
- Una afección que hace que usted tenga mucha sed, actualmente o en el pasado
- Embarazo, planificación de un embarazo o lactancia

También informe a sus médicos acerca de los medicamentos que usted toma. Esto incluye prescripciones, medicamentos sin receta médica, vitaminas, suplementos y remedios herbales. Otros medicamentos pueden interferir en la manera que Stimate funciona.

Es especialmente importante que informe a sus médicos si está tomando cualquiera de los medicamentos siguientes:

- Medicamentos para el corazón o la presión arterial
- Medicamentos para la depresión o la ansiedad
- Antihistamínicos tales como píldoras para la alergia
- Medicamentos para el dolor
- Medicamentos contra las convulsiones
- Medicamentos para una vejiga hiperactiva o incontinencia urinaria

Uso y almacenamiento de Stimate

Use Stimate exactamente tal como sus médicos se lo indiquen. No use más ni tome con más frecuencia de lo que le han indicado.

La bomba de aerosol en la botella de Stimate le da a usted la dosis correcta del medicamento. Dependiendo de su peso, su equipo de atención médica puede recetar una o dos aplicaciones de aerosol por día. Los individuos más pequeños pueden necesitar únicamente una aplicación de aerosol para lograr el efecto deseado.

Hay 25 aplicaciones de aerosol en cada botella. Lleve el control de la cantidad de aplicaciones de aerosol que ha utilizado. Las instrucciones que vienen con el medicamento contienen un cuadro para anotar las aplicaciones. Si su equipo de atención médica recetó dos dosis (una aplicación de aerosol en cada fosa nasal), asegúrese de marcar dos aplicaciones. La botella contiene medicamento adicional para probar el uso del atomizador o cebado. Vea el paso 2 a continuación para aprender acerca del cebado. No cuente las aplicaciones de cebado. Si después de 25 aplicaciones todavía queda medicamento en la botella, no la siga usando. Después de 25 aplicaciones, es posible que el atomizador ya no pueda brindar la dosis correcta. No trate de poner el medicamento dentro de otra botella.


Almacene Stimate a temperatura ambiente, no superior a 77° F. Mantenga la botella en posición vertical.

Arroje la botella 6 meses después de haber sido abierta. Si la fecha de caducidad en la botella ya se ha cumplido, tírela, aún si no han transcurrido los 6 meses. Contacte con la clínica de hematología para un reemplazo.


Instrucciones para el uso del atomizador de aerosol

1. Retire la tapa protectora de la botella.
2. Si está usando la botella por primera vez, debe cebar el atomizador de aerosol. Presione hacia abajo el anillo que se encuentra en la parte superior del atomizador 4 veces. Dirija la punta del aerosol lejos de su cara y ojos.

- Una vez cebado, el atomizador brinda una dosis de 150 microgramos de medicamento cada vez que la presiona. Para asegurarse de obtener la dosis correcta, incline la botella de tal manera que el tubo de su interior extraiga el medicamento de la parte más profunda de la botella. Ver Figuras A y B



3.A Correcto



3.B Incorrecto

- Coloque la punta del aerosol en su fosa nasal y presione el atomizador 1 vez. No inhale. Las membranas del interior de la nariz absorben el medicamento.
- Si su equipo de atención médica recetó 2 dosis, o 300 microgramos, coloque la segunda dosis en su otra fosa nasal.
- Coloque la tapa protectora en la botella.
- Si usted no ha usado el aerosol durante una semana o más, usted deberá cebar la bomba de nuevo. Presione 1 vez, o hasta que vea salir un rocío fino.

Efectos secundarios

El uso de Stimate lo pone en riesgo de acumular demasiada agua en su cuerpo. Usted debe seguir las instrucciones de sus médicos acerca de la cantidad de líquidos que puede beber. Si no lo hace, podría tener convulsiones, entrar en coma o algo peor.

A continuación, se dan algunas recomendaciones acerca de las cantidades de líquidos a beber durante las 24 horas siguientes a cada uso de Stimate:

Si usted pesa...	No beba más de esta cantidad en 24 horas
88 libras	64 onzas o 1.8 litros
110 libras	72 onzas o 2.1 litros
154 libras	80 onzas o 2.3 litros
198 libras o más	96 onzas o 2.8 litros

Stimate también puede reducir la cantidad de sodio en su sangre. Llame a sus médicos de inmediato si le ocurre cualquiera de los siguientes síntomas mientras está usando Stimate:

- Dolor de pecho
- Confusión
- Mareos
- Dolores de cabeza
- Convulsiones
- Pérdida del apetito
- Debilidad muscular, espasmos o calambres
- Náuseas o vómitos
- Latidos rápidos o irregulares del corazón
- Agitación, irritación o sensación de cansancio
- Aumento de peso

Stimate también puede causar otros efectos secundarios de menor gravedad:

- Cambios en la presión arterial
- Síntomas de resfriado
- Sangrado de la nariz
- Garganta irritada o tos
- Nariz congestionada o secreción nasal
- Enrojecimiento o rubor facial

Informe a sus médicos acerca de cualquier efecto secundario que le cause molestias o que no desaparece. No deje de usar Stimate sin antes hablar con sus médicos.