


Un catéter venoso periférico es un tubo largo y flexible, que se inserta por debajo de la piel del pecho hacia una vena. La punta del tubo se coloca en una vena grande justo encima del corazón.

El tubo puede ramificarse en dos o tres extremos afuera de la piel. A estas ramificaciones se las llama lúmenes. Cada lumen tiene una pinza y una tapa para cerrarlo cuando no está en uso.

Un vendaje transparente cubre el área donde el catéter sale de la piel. El vendaje evita el ingreso de aire y agua para que el área se mantenga limpia y seca. Es transparente para que las enfermeras puedan revisar si hay enrojecimientos e infección sin removerlo.



Ubicación del catéter venoso periférico

¿Por qué necesito un catéter venoso periférico?

El catéter brinda a su equipo médico una forma de acceso a sus venas sin necesidad de agujas. Ellos usan los lúmenes del catéter para dar tratamientos, tales como antibióticos, líquidos ricos en calorías, quimioterapia y transfusiones de sangre. También los usan para extraer sangre para sus pruebas de laboratorio.

¿Cómo se coloca mi catéter?

Su equipo médico le colocará su catéter. Primero, limpian y adormecen el área del pecho donde entrará el catéter. Luego hacen una pequeña incisión en la piel e insertan el catéter en una vena grande cerca del corazón. Una vez que está en su lugar, el catéter puede dejarse puesto por semanas o meses.

¿Qué es lo que evita que mi catéter se salga?

Un manguito rodea el tubo del catéter. Usted puede sentirlo como un bultito debajo de la piel. Unas puntadas mantienen el catéter en su lugar hasta que sana la piel alrededor del manguito. Su equipo médico le quitará las puntadas de 7 a 10 días después de la colocación del catéter.

¿Cuándo Debo Llamar a Mi Médico?

Si tiene alguna pregunta acerca de su catéter, llame a su equipo médico. Llame de inmediato si le ocurre algo de lo siguiente:

- Enrojecimiento, inflamación o secreción en la piel alrededor del catéter
- Fiebre mayor que 100.3 °F
- Área inflamada, dolorosa o enrojecida en el cuello, pecho o brazo
- Vendaje mojado, sucio o flojo
- Catéter dañado

De lunes a viernes, de 8 a.m. – 5 p.m.

De lunes a viernes después de las 5 p.m., fines de semana y días festivos

Llame al 801-587-7000. Pregunte por el oncólogo en turno.

¿Cómo puedo cuidar de mi catéter?

Baño. Puede ducharse con su catéter puesto. Primero, cubra el vendaje transparente por completo y por lo menos 2 pulgadas o más a su alrededor con un plástico. Pegue todos los bordes con cinta adhesiva para mantener el área seca mientras se ducha. NUNCA permita que se moje el área del catéter.

Vendaje. Una enfermera le hará el primer cambio de vendaje 24-48 horas después de que el catéter ha sido colocado. Esto se llevará a cabo durante una de sus consultas en la clínica o citas de infusión. Después de eso, su enfermera de la clínica o de cuidados en el hogar cambiarán su vendaje cada 7 días.

Irrigado. Sus enfermeras irrigarán el catéter con solución salina y heparina después de cada uso o por lo menos cada 7 días cuando cambien su vendaje.

Actividad. Puede realizar la mayoría de las actividades cotidianas, tales como trabajar o ir a la escuela, hacer ejercicio y tener relaciones sexuales.

- Evite las actividades extenuantes durante los primeros 7 días después de la colocación del catéter para permitir que la herida sane.
- No levante nada con un peso mayor que 10 libras durante 7 días. Un cesto de lavandería lleno de toallas pesa aproximadamente 10 libras.
- Evite deportes de contacto, tales como fútbol, baloncesto o el levantamiento de pesas.
- Evite la natación, no tome baños de tina ni realice actividades que puedan causar que se moje o ensucie el vendaje o el área debajo del mismo.
- Nunca utilice tijeras u objetos afilados cerca de su catéter.

¿Cómo se retira el catéter?

Su equipo médico retirará el catéter cuando usted ya no lo necesite. Normalmente, esto solo toma unos cuantos minutos.